

## Bauchspeicheldrüse (C25) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode <sup>1)</sup>	Risikopopulation <sup>2)</sup>	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
<b>Insgesamt</b>					
1990-1994	3.992	17,2	7,1	5,9	5,5
1995-1999	4.598	21,0	7,3	5,2	3,9
2000-2004	5.509	24,1	8,1	5,9	4,5
2005-2009	6.195	29,5	10,3	6,8	4,8
2010-2014	7.263	34,8	13,6	9,9	-
2015-2017	4.697	38,2	16,3	-	-
<b>Männer</b>					
1990-1994	1.829	16,6	6,7	5,4	4,9
1995-1999	2.166	21,9	7,5	4,9	3,9
2000-2004	2.533	24,4	8,5	6,0	4,4
2005-2009	3.063	30,0	10,1	6,6	4,9
2010-2014	3.585	35,3	13,6	9,7	-
2015-2017	2.417	38,9	17,0	-	-
<b>Frauen</b>					
1990-1994	2.163	17,6	7,5	6,4	6,0
1995-1999	2.432	20,2	7,2	5,4	3,9
2000-2004	2.976	23,9	7,7	5,9	4,5
2005-2009	3.132	29,0	10,5	7,0	4,8
2010-2014	3.678	34,4	13,7	10,1	-
2015-2017	2.280	37,5	15,6	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.