

Kopf, Hals (C00-C14) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾ N	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
		1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	3.463	71,4	50,7	44,5	34,3
1995-1999	4.264	73,5	52,0	44,4	33,7
2000-2004	4.515	74,4	54,1	45,7	33,7
2005-2009	5.084	76,1	56,3	49,1	36,9
2010-2014	5.410	77,1	57,0	48,9	-
2015-2017	3.623	78,4	60,6	-	-
Männer					
1990-1994	2.703	69,9	47,2	40,7	30,4
1995-1999	3.248	71,7	49,2	41,5	30,8
2000-2004	3.409	73,0	51,6	43,1	30,5
2005-2009	3.755	74,9	53,7	46,4	33,8
2010-2014	3.983	76,6	55,4	46,7	-
2015-2017	2.641	77,4	58,8	-	-
Frauen					
1990-1994	760	76,5	63,0	58,2	48,1
1995-1999	1.016	79,1	60,9	53,8	43,0
2000-2004	1.106	78,7	61,8	53,9	43,7
2005-2009	1.329	79,4	63,5	56,9	45,5
2010-2014	1.427	78,3	61,4	55,0	-
2015-2017	982	80,8	65,4	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.