

Speiseröhre (C15) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	958	31,9	12,3	9,5	6,0
1995-1999	1.331	36,8	15,4	11,1	8,5
2000-2004	1.614	43,9	21,8	16,8	13,3
2005-2009	1.828	46,2	22,9	17,3	12,6
2010-2014	1.984	49,9	26,5	21,0	-
2015-2017	1.241	49,9	26,7	-	-
Männer					
1990-1994	795	31,8	11,3	8,7	5,0
1995-1999	1.096	37,9	15,7	11,1	7,9
2000-2004	1.295	45,3	21,8	16,6	12,9
2005-2009	1.489	46,6	22,4	16,9	12,2
2010-2014	1.567	49,6	25,5	19,9	-
2015-2017	970	51,2	26,6	-	-
Frauen					
1990-1994	163	32,3	17,3	13,3	11,4
1995-1999	235	31,7	14,3	11,1	11,1
2000-2004	319	38,2	21,6	17,7	15,0
2005-2009	339	44,1	24,8	19,1	14,3
2010-2014	417	51,1	30,1	25,1	-
2015-2017	271	45,2	26,9	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.