

Hodgkin (C81) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	723	90,9	82,1	76,4	70,9
1995-1999	811	90,1	84,1	81,0	75,6
2000-2004	923	93,1	88,9	85,4	80,1
2005-2009	936	91,2	86,9	84,7	81,1
2010-2014	947	92,8	89,1	87,5	-
2015-2017	468	91,3	88,8	-	-
Männer					
1990-1994	366	90,0	81,4	74,9	69,7
1995-1999	437	88,4	81,8	79,3	74,5
2000-2004	530	92,9	89,2	85,7	79,1
2005-2009	505	91,7	87,3	84,2	79,5
2010-2014	506	91,3	87,6	85,5	-
2015-2017	270	91,0	89,0	-	-
Frauen					
1990-1994	357	91,8	82,9	77,9	72,0
1995-1999	374	92,1	86,7	82,9	76,9
2000-2004	393	93,4	88,4	84,9	81,3
2005-2009	431	90,7	86,6	85,4	83,0
2010-2014	441	94,5	90,8	89,7	-
2015-2017	198	91,7	88,5	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.