

Non-Hodgkin (C82-C86,C96) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾ N	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
		1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	3.439	70,4	57,9	52,2	43,5
1995-1999	4.459	73,2	59,7	53,5	45,0
2000-2004	5.407	76,3	66,4	61,2	54,0
2005-2009	5.854	78,3	69,5	65,6	59,4
2010-2014	6.255	78,7	70,6	67,1	-
2015-2017	3.880	79,2	71,8	-	-
Männer					
1990-1994	1.691	70,3	58,0	52,7	43,3
1995-1999	2.210	73,8	59,9	53,1	43,9
2000-2004	2.728	76,6	66,6	61,7	54,7
2005-2009	3.065	79,3	69,4	65,5	59,6
2010-2014	3.336	78,7	70,7	67,5	-
2015-2017	2.149	78,0	70,2	-	-
Frauen					
1990-1994	1.748	70,4	57,7	51,7	43,8
1995-1999	2.249	72,7	59,5	53,9	46,0
2000-2004	2.679	76,0	66,2	60,8	53,2
2005-2009	2.789	77,2	69,7	65,8	59,1
2010-2014	2.919	78,7	70,5	66,6	-
2015-2017	1.731	80,8	73,8	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.