

Kehlkopf (C32) - Relative Überlebensraten in Österreich nach Geschlecht (1990-2017)

Diagnose- periode ¹⁾	Risikopopulation ²⁾	Überleben nach Diagnose (in Jahren)			
	N	1	3	5	10
Insgesamt					
1990-1994	1.470	79,7	62,0	55,6	44,7
1995-1999	1.588	83,2	66,7	58,9	46,7
2000-2004	1.519	82,5	64,7	58,6	45,3
2005-2009	1.517	84,0	68,7	59,6	46,6
2010-2014	1.461	84,8	69,2	61,3	-
2015-2017	974	85,1	66,4	-	-
Männer					
1990-1994	1.324	79,7	61,8	55,4	44,4
1995-1999	1.423	83,2	66,3	58,3	45,8
2000-2004	1.334	82,7	64,8	58,6	45,0
2005-2009	1.329	83,8	67,4	59,0	46,0
2010-2014	1.266	85,0	68,7	60,7	-
2015-2017	853	84,9	65,7	-	-
Frauen					
1990-1994	146	79,4	63,6	57,0	47,4
1995-1999	165	83,2	69,8	64,3	54,1
2000-2004	185	81,3	63,6	58,9	47,7
2005-2009	188	85,4	77,4	64,0	50,7
2010-2014	195	83,3	72,9	65,1	-
2015-2017	121	86,0	72,0	-	-

Q: STATISTIK AUSTRIA, Österreichisches Krebsregister (Stand 09.12.2019). Erstellt am 17.12.2019. 1) Ende des Follow-up 31.12.2018. - 2) Maligne invasive Fälle, exkl. DCO-Fälle.